

SVAR OCH ANVISNINGAR DEL 1

1.  $\frac{1}{2}$
2. 1
3. 3
4.  $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \tanh x$
5.  $\frac{2x}{1 + (1 + x^2)^2}$
6.  $\ln|x| + 1$
7.  $-\infty$
8. 0
9. 0
10.  $|x| > \frac{1}{e}$
11.  $\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2}$
12.  $f^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ -\sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$
13.  $(2, \frac{1}{2})$
14.  $(0, 0)$
15.  $x$ -axeln

1. Då definitionsmängden är öppen sökes absoluta extrempunkterna bland de kritiska och singulära punkterna.

$$f'(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ e^{-\frac{1}{3}x}(-1 + x \cdot \frac{1}{3}), & x > 0 \end{cases}$$

Funktionens största värde är 1 eftersom  $f(0) = 1$  och  $f(x) < 1$ ,  $x \neq 0$ . Vidare är  $f'(x) = e^{-\frac{1}{3}x}(-1 + x \cdot \frac{1}{3}) = 0$  omm  $x = 3$ . Detta är enda kritiska punkten. Då  $f$  är kontinuerlig och  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$  så är  $f(3) = 1 - \frac{3}{e} < 0$  absolut minimum (Adam's Gift).

2. Då  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$  är funktionen kontinuerlig i origo och då dessutom

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln^2 |x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln^2 |x| = +\infty$$

så är  $y$ -axeln vertikal tangent i origo.

Funktionen är udda och strikt växande i en omgivning av origo och det räcker därför att studera den för  $x > 0$ . Vi noterar att  $f(x) > 0$ ,  $x > 0$ ,  $x \neq 1$  och att  $f(1) = 0$  därför är ett minimum som blir lokalt för funktionen som helhet.

$f'(x) = \ln^2 x + 2x \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x} = \ln x(\ln x + 2)$ ,  $x > 0$ .  $f'(x) = 0$  omm  $x = 1/e^2$  eller  $x = 1$ . Eftersom  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(1)$  har funktionen ett maximum  $= 4/e^2$  för  $x = 1/e^2$  (Adam's Gift) och då  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  är detta maximum lokalt. Mot detta lokala maximum svarar förstås ett motsvarande lokalt minimum då funktionen är udda.

1.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

eller mer noggrant:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in D_f \ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

där  $D_f$  betecknar definitionsmängden till  $f$ .

2. Medelvärdessatsen (The Mean Value Theorem - sats 11 på sidan 133 i Adams; bilden finns också på sidan 133 - Figure 2.25.):

Antag att funktionen  $f(x)$  är kontinuerlig i det slutna ändliga intervallet  $[a, b]$  och deriverbar i det öppna intervallet  $(a, b)$ . Då finns det en punkt  $c \in (a, b)$  så att

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Tolkningen: För en funktion som uppfyller villkoren i satsen finns det en punkt  $c \in (a, b)$  så att tangenten till kurvan  $y = f(x)$  har lutningskoefficient

$$k = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

i punkten  $(c, f(c))$ , vilket betyder att tangenten är parallell med linjen som går igenom  $(a, f(a))$  och  $(b, f(b))$ .

3. Vi undersöker

$$\frac{n+1}{xn^2+2n} = \frac{n}{xn^2+2n} + \frac{1}{xn^2+2n} = \frac{1}{xn+2} + \frac{1}{xn^2+2n}$$

och finner att den sista av dessa termer går mot 0 för alla  $x$  medans den första går mot 0 om  $x \neq 0$  och mot  $1/2$  om  $x = 0$ . Alltså har vi

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

Funktionen är konstant i intervallet  $(-\infty, 0)$  och i intervallet  $(0, \infty)$  och är därför kontinuerlig för alla  $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ . Funktionen är inte kontinuerlig i  $x = 0$  eftersom höger- och vänstergränsvärden i  $x = 0$  är lika med noll, medan  $f(0) = \frac{1}{2}$ .

4. Antag att funktionen  $f(x)$  är kontinuerlig i intervallet  $(a, b)$  och att för punkten  $c$  i  $(a, b)$  gäller  $f(c) < 0$ . Visa att då måste  $f(x)$  anta negativa värden i någon omgivning av  $c$ , dvs att  $f(x) < 0$  för alla  $x$  i intervallet  $(c - \delta, c + \delta)$ , där  $\delta$  är något litet positivt tal:

**bevis:** Låt  $\varepsilon = \frac{|f(c)|}{2}$ . Eftersom funktionen är kontinuerlig, har vi  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ . Från  $(\varepsilon, \delta)$ -definitionen vet vi att för detta  $\varepsilon$  gäller:

$$\exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x \in (a, b) \quad |x - c| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \frac{|f(c)|}{2}$$

och det kan man skriva om (enligt definitionen av absolutbelopp) som:

$$\exists \delta_\varepsilon > 0 \quad \forall x \in (a, b) \quad x \in (c - \delta_\varepsilon, c + \delta_\varepsilon) \Rightarrow f(c) - \frac{|f(c)|}{2} < f(x) < f(c) + \frac{|f(c)|}{2}$$

och, eftersom

$$f(c) + \frac{|f(c)|}{2} = -|f(c)| + \frac{|f(c)|}{2} = -\frac{|f(c)|}{2} < 0,$$

då är  $(c - \delta_\varepsilon, c + \delta_\varepsilon)$  en omgivning av  $c$  där alla funktionens värden är negativa och därmed är satsen bevisad.

OBS: man kan använda samma resonemang för att bevisa en analog sats för *positiva* värden.