

Baskurs i matematik 2008-06-09

Lösningsförslag

1. (a) Låt $P(x)$ vara ett påstående om x , där x betecknar ett naturligt tal $(0, 1, 2, \dots)$.

Induktionsaxiomet säger om följande två punkter stämmer så är $P(x)$ sann för alla naturliga tal x .

- $P(0)$ är sann. ("basfallet")
- Om $P(n)$ är sann så att $P(n+1)$ sann. ("induktionssteget")

1 (b) Basfall: För $n=0$ får

$$\text{vi } VL = 2 - \sum_{k=0}^0 \frac{1}{2^k} = 2 - \frac{1}{2^0} = 2 - 1 = 1$$

och $HL = \frac{1}{2^0} = 1$, så det stämmer

för $n=0$.

Induktionsreg: Antag att

$$2 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} \text{ stämmer.}$$

Vi visar att samma sak stämmer om n byts ut mot $n+1$.

$$2 - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{2^k} = 2 - \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \right) =$$

$$2 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} - \frac{1}{2^{n+1}} =$$

$$\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^{n+1}}$$

enligt (induktions-) antagandet
ovan

$$= \frac{2-1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^{n+1}}.$$

Så påståendet stämmer även
för $n+1$. Enligt induktions-
axiomet så följer att

$$2 - \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} \quad \text{för alla } n=0,1,2,\dots$$

2. (a) Eftersom ett B alltid står
längst till vänster så har vi
4 val för nästa plats,
sedan 3 val — " — ,
sedan 2 val — " — , och
sist 1 val för den sista platsen.

Alltså kan $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$
 $= 24$ olika ord bildas på det
sättet.

2 (b) Betrakta följande sifferblocket
som ett enda tecken S.

Med tecknen A, B, C, D, E, S
kan $6!$ ord bildas.

Och sedan byts S ut mot
det tre siffrorna 1, 2, 3 i
vilken ordning som helst, oavsett
av var sifferblocket finns.

Detta ger $6! \cdot 3!$ olika "ord".

3 (a) $|2x - 8| \geq 4$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 8 \geq 4 \\ \text{eller } 2x - 8 \leq -4 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 6 \\ \text{eller } x \leq 2 \end{cases}$$

Alternativt: $(-\infty, 2] \cup [6, \infty)$.

$$3(b) \quad x+3 \leq \frac{5}{x-1}$$

$$\Leftrightarrow x+3 - \frac{5}{x-1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-1)(x+3) - 5}{x-1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2x - 8}{x-1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x+4)(x-2)}{x-1} \leq 0$$

Zeichentabelle:

	-4				2	
$x+4$	-	0	+		+	+
$x-2$	-		-		-	0
$x-1$	-		-	0	+	+
$\frac{(x+4)(x-2)}{x-1}$	-	0	+	undef.	-	0

Olikheten är uppfylld om och endast om

$$x \leq -4 \text{ eller } -1 < x \leq 2.$$

Med intervallnotationen så ges mängden av lösningar av

$$(-\infty, -4] \cup (-1, 2].$$

$$4 \text{ (a)} \quad 2^{(\log_3(9) + 2 + \log_2(3))}$$

$$= 2^{(2 + 2 + \log_2(3))}$$

$$= 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^{\log_2(3)}$$

$$= 16 \cdot 3 = 48,$$

$$(b) \quad 2^{x+2} - 8^{\frac{1}{x}} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^{x+2} = 8^{\frac{1}{x}}$$

$$\Rightarrow \log_2(2^{x+2}) = \log_2(8^{\frac{1}{x}})$$

$$\Rightarrow (x+2) \log_2(2) = \frac{1}{x} \log_2(8)$$

$$\Rightarrow x+2 = \frac{3}{x}$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = -3 \text{ eller } x = 1.$$

Detta visar att inga andra tal än $x = -3$ och $x = 1$ kan vara lösningar. Insättning i ursprungsekvationen visar att de faktiskt är lösningar.

5 (a) Beräkning av kvot och rest:

$$\begin{array}{r|l} x^2 - x & x^3 - 2x^2 + 4x - 8 \\ & x^5 - 3x^4 + 6x^3 - 12x^2 + 8x \\ & \underline{x^5 - x^4} \\ & -2x^4 + 6x^3 - 12x^2 + 8x \\ & \underline{-2x^4 + 2x^3} \\ & 4x^3 - 12x^2 + 8x \\ & \underline{4x^3 - 4x^2} \\ & -8x^2 + 8x \\ & \underline{-8x^2 + 8x} \\ & 0 \end{array}$$

Kvoten blir $x^3 - 2x^2 + 4x - 8$
och resten 0, så

$$\begin{aligned} p(x) &= x^5 - 3x^4 + 6x^3 - 12x^2 + 8x \\ &= (x^2 - x)(x^3 - 2x^2 + 4x - 8). \end{aligned}$$

5(b) Eftersom $x^2 - x = x(x-1)$

så är rötterna till $x^2 - x = 0$,
 $x = 0$ och $x = 1$.

Övriga rötter till $p(x) = 0$
måste vara rötter till

$$x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = 0$$

(enligt (a) - delen).

Vi har fått ledtråden att bi
är en rot för något reellt b .

Insättning ger

$$b^3 i^3 - 2b^2 i^2 + 4bi - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow -b^3 i + 2b^2 + 4bi - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4b - b^3 = 0 \\ 2b^2 - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow b^2 = 4 \Rightarrow b = \pm 2.$$

Insättning av $\pm 2i$ visar att dessa
tal är rötter.

Då delas $x^3 - 2x^2 + 4x - 8$
jämnt av polynomet

$$(x - 2i)(x + 2i) = x^2 + 4.$$

Divisionen, som överlämnas åt
läsaren, visar att

$$x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = (x^2 + 4)(x - 2),$$

så den sista roten är $x = 2$.

Nu har vi funnit alla fem
(enkel) rötterna till 5:e-grads-
ekvationen $p(x) = 0$:

$$x = 0, 1, 2, \pm 2i.$$

6 (a) Avståndet mellan $(-1, 1)$
och $(1, 4)$ är

$$\sqrt{(1 - (-1))^2 + (4 - 1)^2} = \sqrt{13}.$$

Linjens ekvation har formen

$$y = kx + m.$$

I detta fall gäller

$$k = \text{lutningen} = \frac{4 - 1}{1 - (-1)} = \frac{3}{2}$$

$$\text{så vi får } y = \frac{3}{2}x + m.$$

Eftersom linjen i detta fall passerar
genom $(-1, 1)$ så gäller

$$1 = \frac{3}{2}(-1) + m, \text{ så}$$

$$m = \frac{5}{2}, \text{ och ekvationen}$$

$$\text{blir } y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}.$$

6(6) Skärningspunkterna (x, y)
måste uppfylla båda ekvationerna,
dvs. systemet

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ y = x^2 - 2 \end{cases}$$

Substitution av $x^2 = y + 2$
i den övre ekvationen ger

$$y^2 + y = 0$$

$$\Leftrightarrow y(y + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 0 \text{ eller } y = -1.$$

Nu ser vi vad vi får för x -värden
för respektive y -värde.

$$y = 0 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

(enligt den övre ekvationen)

$$y = -1 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

(enligt den övre ekvationen)

Detta ger oss skärningspunkterna

$$(\sqrt{2}, 0), (-\sqrt{2}, 0)$$

$$(1, -1), (-1, -1).$$


7 (a) Låt $y = 2x$. Vi löser
först $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Beträktelse

av 30-60-90-graders-triangeln
visar att $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Betraktelse av enhetscirkeln visar
att på intervallet $[0, 2\pi)$ så

löser $y = \frac{\pi}{6}$ och $y = \frac{11\pi}{6}$

ekvationen $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2}$



Samtliga lösningar till $\cos y = \frac{\sqrt{3}}{2}$
ger då av

$$y = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n = \pm 0, 1, 2, \dots$$

och $y = \frac{11\pi}{6} + 2\pi n, \quad n = \pm 0, 1, 2, \dots$

Eftersom $y = 2x$, så ges då
samtliga lösningar till $\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

av $x = \frac{\pi}{12} + \pi n, \quad n = \pm 0, 1, 2, \dots$

och $x = \frac{11\pi}{12} + \pi n, \quad n = \pm 0, 1, 2, \dots$

$$7 (b) \quad \sin(6x) + \cos(3x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sin(3x)\cos(3x) + \cos(3x) = 0.$$

Fall 1: $\cos(3x) = 0$ ger

$$\Leftrightarrow 3x = \frac{\pi}{2} \pm \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} \pm \frac{\pi n}{3}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Fall 2: $\cos(3x) \neq 0$.

Division med $\cos(3x)$ omvandlar
 ekv. till $2\sin(3x) + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \sin(3x) = -\frac{1}{2}.$$

På liknande sätt som i (a)-delen
 får man lösningarna

$$x = \frac{7\pi}{18} \pm \frac{2\pi n}{3}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

och $x = \frac{11\pi}{18} \pm \frac{2\pi n}{3}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

Lösningarna är de beskrivna x :en
 från båda fallen.

$$8 \quad (a) \quad \frac{z}{w} =$$

$$\frac{6}{2} \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) \right) =$$

$$3 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 3(0 + i) = 3i$$

$$w^3 = 2^3 \left(\cos \frac{3\pi}{6} + i \sin \frac{3\pi}{6} \right) =$$

$$= 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 8(0 + i)$$

$$= 8i$$

$$(b) \quad z^3 = 8i = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right).$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \quad \text{or} \quad r e^{i\theta}$$

lösning

$$\Leftrightarrow r^3 (\cos 3\theta + i \sin 3\theta) =$$

$$8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} \pm 2\pi k\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm 2\pi k\right) \right)$$

$$\text{där } k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r^3 = 8 \\ 3\theta = \frac{\pi}{2} \pm 2\pi k, k=0,1,2,\dots \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r = 2 \\ \theta = \frac{\pi}{6} \pm \frac{2\pi k}{3}, k=0,1,2,\dots \end{cases}$$

Det räcker att betrakta $k=0,1,2$,
och positivt tecken framför $\frac{2\pi k}{3}$
vilket ger oss

$$\theta_0 = \frac{\pi}{6}$$

$$\theta_1 = \frac{5\pi}{6}$$

$$\theta_2 = \frac{3\pi}{2}$$

Detta ger lösningarna

$$z_0 = 2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} + i$$

$$z_1 = 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right) = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right) = 2(0 - i) = -2i$$