

INTEGRALER AV RATIONELLA FUNKTIONER

A) Täljaren har samma eller högre gradtal än nämnaren

Utför polynomdivision eller andra algebraiska manipulationer för att åstadkomma en kvot (ett **polynom**) plus en **rest** (som går att integrera enligt **B**). Jfr ex 11.8 på sid 302 i kursboken.

B) Täljaren (T) är av lägre grad än nämnaren (N).

* Nämnaren är av första graden:

$$\text{Ex 1. } \int \frac{a}{1+bx} dx = \frac{a \ln|1+bx|}{b} + C,$$

** N är av högre grad än 1;

Frågeställning: **Är T en derivata till N?** Om **Ja**

$$\text{Ex 2. } \int \frac{12x^3 + 14x - 8}{3x^4 + 7x^2 - 8x + 12} dx = \ln|3x^4 + 7x^2 - 8x + 12| + C,$$

Om Nej

I. N är av andra graden och N=0 ger komplex lösning

$$1) \text{ Ex 3. } \int \frac{5}{x^2 + 6x + 10} dx$$

Sätt $N=0$
 $x^2 + 6x + 10 = 0 \Leftrightarrow x = -3 \pm \sqrt{9 - 10} \Rightarrow \text{Reell lösning saknas.}$

Kvadratkomplettera

$$x^2 + 6x + 10 = x^2 + 6x + 9 - 9 + 10 = (x + 3)^2 + 1.$$

$$\int \frac{5}{x^2 + 6x + 10} dx = \int \frac{5}{1 + (x + 3)^2} dx = 5 \arctan(x + 3) + C.$$

$$2) \text{ Ex 4. } \int \frac{2x + 10}{x^2 + 6x + 10} dx = \int \frac{2x + 6}{x^2 + 6x + 10} dx + \int \frac{4}{x^2 + 6x + 10} dx = I_1 + I_2 + C$$

$$I_1 = \ln|x^2 + 6x + 10| = \ln(x^2 + 6x + 10) \text{ Se Ex 2, och}$$

$$I_2 = 4 \arctan(x + 3) \text{ Se Ex 3.}$$

$$\int \frac{2x + 10}{x^2 + 6x + 10} dx = \ln(x^2 + 6x + 10) + 4 \arctan(x + 3) + C.$$

$$3) \text{ Ex 5. } \int \frac{5}{x^2 + 6x + 13} dx$$

$N=0$ ger $x^2 + 6x + 13 = 0 \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{9 - 13} \Rightarrow$ ekvationen saknar reell lösning. Jfr Ex 3.
 Efter kvadratkomplettering erhålls

$$\int \frac{5}{x^2 + 6x + 13} dx = \int \frac{5}{(x+3)^2 + 4} dx = \frac{5}{4} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x+3}{2}\right)^2} =$$

$$\frac{5}{4} \cdot 2 \cdot \arctan\left(\frac{x+3}{2}\right) + C = \frac{5}{2} \arctan\left(\frac{x+3}{2}\right) + C.$$

II. N är av andra graden och N=0 ger reell lösning

$$1) \text{ Ex 6. } \int \frac{3}{(x-2)^2} dx = \left[\begin{array}{l} u = x-2 \\ \frac{du}{dx} = 1 \\ du = 1 \cdot dx \end{array} \right] = \int \frac{3}{u^2} du = \int 3 \cdot u^{-2} du = -3u^{-1} + C = -\frac{3}{x-2} + C.$$

Alternativ lösning

$$\int \frac{3}{(x-2)^2} dx = \int 3(x-2)^{-2} dx = \frac{3(x-2)^{-1}}{-1} + C.$$

$$2) \text{ Ex 7. } \int \frac{3x}{(x-2)^2} dx = \left[\begin{array}{l} u = x-2 \\ \frac{du}{dx} = 1 \\ du = 1 \cdot dx \\ x = u+2 \end{array} \right] = \int \frac{3(u+2)}{u^2} du = \int \left(\frac{3u}{u^2} + \frac{6}{u^2} \right) du =$$

$$\int \left(\frac{3}{u} + 6u^{-2} \right) du = 3 \ln |u| - 6u^{-1} + C = 3 \ln |x-2| - \frac{6}{x-2} + C.$$

$$3) \text{ Ex 8. } \int \frac{3x+5}{x^2-1} dx \quad \mathbf{N=0} \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Partialbråksuppdelning

$$\frac{3x+5}{x^2-1} = \frac{3x+5}{(x+1)(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1) + B(x+1)}{(x+1)(x-1)} =$$

$$\frac{(A+B)x + (B-A)}{(x+1)(x-1)}$$

Bestämning av A och B kan ske på olika sätt; t.ex:

$$* \quad 3x+5 \equiv A(x-1) + B(x+1) \quad (\text{Välj lämpliga } x\text{-värden})$$

$$x=1 \Rightarrow 8 = 2B \Leftrightarrow B=4$$

$$x=-1 \Rightarrow 2 = -2A \Leftrightarrow A=-1$$

$$** \quad 3x+5 = (A+B)x + (B-A)$$

Identifiering av koefficienter ger

$$\begin{cases} 3 &= A+B \\ 5 &= B-A \end{cases} \quad \text{Ekvationssystemet ger } A=-1 \text{ och } B=4.$$

Integralen kan nu skrivas om och lösas:

$$\int \frac{3x+5}{x^2-1} dx = \int \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{4}{x-1} \right) dx = -\ln|x+1| + 4\ln|x-1| + C.$$

Jfr ex 11.9, 11.10 och 11.11 i kursboken.

III. N är av högre gradtal än 2.

Faktoruppdelning och partialbråksuppdelning.

$$\text{Ex 9. } \int \frac{3x^2 + 7x + 5}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} dx \quad \mathbf{N=0} \Leftrightarrow x = -1.$$

Partialbråksuppdelning

$$\begin{aligned} \frac{3x^2 + 7x + 5}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 2} \\ &= \frac{A(x^2 + 2x + 2) + (Bx + C)(x+1)}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} \\ &= \frac{(A+B)x^2 + (2A+B+C)x + 2A+C}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)}. \end{aligned}$$

Identifiering ger $A+B=3$, $2A+B+C=7$ och $2A+C=5$. Systemet har lösningen $A=1$, $B=2$ och $C=3$.

$$\frac{3x^2 + 7x + 5}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} = \frac{1}{x+1} + \frac{2x+3}{x^2 + 2x + 2}.$$

Alltså

$$\begin{aligned} \int \frac{3x^2 + 7x + 5}{(x+1)(x^2 + 2x + 2)} dx &= \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{2x+3}{x^2 + 2x + 2} dx \\ &= \ln|x+1| + \int \frac{2x+2}{x^2 + 2x + 2} dx + \int \frac{1}{1+(x+1)^2} dx \\ &= \ln|x+1| + \ln(x^2 + 2x + 2) + \arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$