

Tentamen består av 8 problem (max 5 poäng per problem) till vilka fordras fullständiga lösningar. 18 - 24 poäng ger betyget 3, 25 - 31 betyget 4, 32 - 40 betyget 5

Skrivtid: 08.00-13.00 **Tillåtna hjälpmedel:** Skrivdon.

1. Beräkna

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - \ln(1-x^2)}{e^{x^2} - e^{-x^2}}.$$

2. Bestäm den lösning till differentialekvationen $y''+4y = \sin x$ för vilken $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

3. Beräkna integralerna

a) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx.$ b) $\int_1^\infty \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx.$

4. Skissa kurvan

$$y = \frac{(x^2 - 1)^2}{x^3} = x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3}.$$

Bestäm särskilt definitionsmängden, nollställen samt eventuella lokala extempunkter, asymptoter och inflexionspunkter.

5. Bestäm det största värdet av funktionen

$$f(x) = x^2 e^{-|x-1|}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Motivera noggrant.

6. Lös differentialekvationen $y' + \frac{2}{x} y = \frac{1 - \cos x}{x^2}$, $x \neq 0$.

7. Avgör om följande serier är konvergenta eller divergenta.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$ b) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin n)(\sin \frac{1}{n^2}).$

8. Bevisa att om

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

så är $f'(0) = 0$. Det gäller till och med att alla derivatorna $f^{(n)}(0) = 0$ för $n = 1, 2, 3, \dots$. Försök även bevisa detta. Skissa slutligen kurvan. Ange särskilt dess asymptoter.

V.G.V!

Trigonometriska formler

$$\begin{aligned}
 \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & \sin^2(x/2) &= (1 - \cos x)/2 \\
 \sin 2x &= 2 \sin x \cos x & \cos^2(x/2) &= (1 + \cos x)/2 \\
 \cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x & \sin x \sin y &= (\cos(x - y) - \cos(x + y))/2 \\
 \sin(x \pm y) &= \sin x \cos y \pm \cos x \sin y & \sin x \cos y &= (\sin(x + y) + \sin(x - y))/2 \\
 \cos(x \pm y) &= \cos x \cos y \mp \sin x \sin y & \cos x \cos y &= (\cos(x + y) + \cos(x - y))/2
 \end{aligned}$$

Maclaurinutvecklingar

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots & (-\infty < x < \infty) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots & (-\infty < x < \infty) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots & (-\infty < x < \infty) \\
 \ln(1 + x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots & (-1 < x \leq 1) \\
 \sin^{-1} x &= x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \cdots & (-1 \leq x \leq 1) \\
 \tan^{-1} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots & (-1 \leq x \leq 1) \\
 (1 + x)^\alpha &= 1 + \frac{\alpha}{1!} x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)}{3!} x^3 + \cdots & (-1 < x < 1)
 \end{aligned}$$